

The Broset Violence Checklist © (BVC)¹. Инструкция: Отмечайте изменения поведения пациента за наблюдаемое время. Отсутствие наблюдаемых отклонений в поведении оценивается как 0. Наличие отклонений в поведении оценивается как 1. Максимальная сумма - 6. Если данное поведение является характерным для наблюдаемого пациента, то только изменения в поведении оцениваются как 1. Например, если для больного характерна спутанность в течение долгого времени, то такое поведение оценивается как 0. Если наблюдается усиление спутанности, то оно оценивается как 1.

Спутанность, дезориентация	Помрачение сознания или дезориентация во времени, месте, собственной личности.
Раздражительность	Легко возникающая гневливость, недовольство, неприязнь к окружающим. Неспособность переносить присутствие окружающих людей
Буйство	Явное поведение, сопровождающееся криком и шумом. Например, хлопать дверью, крики, возгласы в разговоре и т.д.
Словесные угрозы	Разговор на повышенных тонах. Склонность к запугиванию, высказывание угроз в адрес окружающих. Например, словесные выпады, оскорбления, давать обидные названия, унижения.
Физические угрозы	Очевидные намерения причинить физический вред окружающим. Например, хватание за одежду, замахивания рукой, ногой, попытки ударить головой.
Разрушительные действия	Повреждение окружающих предметов (не людей). Например, беспорядочное разбрасывание предметов. Удары или повреждения окон, предметов мебели, удары ногой, рукой или головой по предметам.

Интерпретация и использование в работе